

Oxyboldine

CITRON SANS SUCRE

Comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique

Boldine, Sulfate de sodium anhydre, Dihydrogénophosphate de sodium anhydre

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que OXYBOLDINE CITRON SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre OXYBOLDINE CITRON SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique ?
3. Comment prendre OXYBOLDINE CITRON SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver OXYBOLDINE CITRON SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE OXYBOLDINE CITRON SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : A05C - Cholagogue – cholérétique

Indications thérapeutiques : Ce médicament est préconisé, chez l'adulte, en traitement d'appoint des digestions difficiles.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE OXYBOLDINE CITRON SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique ?

Ne prenez jamais OXYBOLDINE CITRON SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique :

- si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez une obstruction des voies biliaires ou une grave maladie du foie.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre OXYBOLDINE CITRON SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique.

La dose maximale journalière de ce médicament, soit 3 comprimés par jour, équivaut à 66% de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé par l'OMS pour un adulte. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien si vous avez besoin d'un comprimé ou de plus d'un comprimé quotidiennement pendant une période prolongée, surtout si vous devez suivre un régime à faible teneur en sel (sodium).

En cas de diarrhée ou de douleurs abdominales, arrêtez le traitement et consultez votre médecin.

Autres médicaments et OXYBOLDINE CITRON SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas prendre ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucun effet susceptible d'altérer l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'est attendu avec ce produit.

OXYBOLDINE CITRON SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique contient des sels de sodium : 1 comprimé contient 426 mg de sodium.

3. COMMENT PRENDRE OXYBOLDINE CITRON SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la saccharine sodique ?

Posologie

RÉSERVÉ À L'ADULTE.

Dissoudre dans un verre d'eau, 1 comprimé, avant les 3 principaux repas ou au moment des troubles.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Fréquence d'administration

Prendre 1 comprimé avant chacun des principaux repas ou au moment des troubles, sans dépasser 3 comprimés par jour.

Durée du traitement

Le traitement sera limité à 7 jours.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.

NE PAS UTILISER DE FAÇON PROLONGÉE SANS AVIS MÉDICAL.

Si vous avez pris plus de OXYBOLDINE CITRON SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré

à la saccharine sodique que vous n'auriez dû

Vous pourriez être sujet à des diarrhées.

Si vous oubliez de prendre OXYBOLDINE CITRON SANS SUCRE, comprimé effervescent

édulcoré à la saccharine sodique

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Risque de diarrhée à fortes doses,
- De rares cas de réactions cutanées ont été rapportés.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER OXYBOLDINE CITRON SANS SUCRE, comprimé effervescent

édulcoré à la saccharine sodique ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. Conserver le tube soigneusement

fermé à l'abri de l'humidité.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient OXYBOLDINE CITRON SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à

la saccharine sodique

Les substances actives sont :

Boldine 0,5 mg

Sulfate de sodium anhydre 54,0 mg

Dihydrogénophosphate de sodium anhydre 132,0 mg

Pour un comprimé effervescent.

Les autres composants sont :

Bicarbonate de sodium, acide citrique anhydre, acide tartrique, benzoate de sodium (voir rubrique

2), arôme citron*, saccharine sodique.

* Composition de l'arôme citron : bêta pinène, limonène (voir rubrique 2), gamma terpène, néral,

géraniol, maltodextrine, gomme arabique, acide citrique.

1 comprimé contient 426 mg de sodium (voir rubrique 2).

Qu'est-ce que OXYBOLDINE CITRON SANS SUCRE, comprimé effervescent édulcoré à la

saccharine sodique et contenu de l'emballage extérieur

Tube de 12 comprimés (polypropylène) fermé par un bouchon (polyéthylène) contenant un

déshydratant (gel de silice).

Titulaire / Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE

Place Lucien Auvert - 77020 Melun Cedex - FRANCE

Fabricant

DELPHARM GAILLARD

33 rue de l'Industrie - 74240 Gaillard - FRANCE

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est mars 2018.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE

Place Lucien Auvert - 77020 Melun Cedex

103109 / V00

