



# Sédermyl

DEMANGEAISONS :  
piqûres d'insectes et végétaux

Chlorhydrate d'isothipendyl 0,75%

## — IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

**DENOMINATION :** SEDERMYL 0,75 POUR CENT, crème

## 🍷 COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

Chlorhydrate d'isothipendyl ..... 0,75 g  
Excipients : Edétate de sodium, alcool céstostéarylique émulsifiant (type A) (Lanette N®), décylester d'acide oléique (Cétiol®V), alcool cétylique, propylène glycol, eau purifiée. .... pour 100 g de crème

**FORME PHARMACEUTIQUE :** Crème, Tubes de 35 g et de 60 g.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

ANTIHISTAMINIQUE PAR VOIE LOCALE - ANTIPRURIGINEUX (D : Dermatologie)

## NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT :

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE

Place Lucien Auvert - 77020 MELUN Cedex

## — DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT :

Ce médicament contient un antihistaminique.

Il est préconisé en cas de démangeaison, en particulier piqûres d'insectes.

## ! ATTENTION !

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT :

Ce médicament **NE DOIT PAS ETRE UTILISE** dans les cas suivants :

- antécédents d'allergie aux antihistaminiques,
- lésions cutanées infectées ou irritées,
- lésions cutanées suintantes.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

## MISES EN GARDE SPECIALES :

Ne pas appliquer sur une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau lésée ou chez le nourrisson en raison du risque de passage du principe actif dans le sang.

Ne pas appliquer sur les muqueuses.

La démangeaison n'est qu'un symptôme qui peut avoir des causes multiples nécessitant l'avis de votre médecin en particulier en cas de persistance ou d'aggravation des troubles.

## **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :**

*AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.*

**LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS :** Propylèneglycol.

## **➔ COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT :**

**POSOLOGIE :** 1 application 2 à 3 fois par jour.

**MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :** Voie cutanée.

## **DUREE DU TRAITEMENT :**

En cas de persistance des troubles après 8 jours de traitement, consulter votre médecin.

## **❗ EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :**

*COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS, notamment risque d'allergie à un composant de la crème.*

*NE PAS HESITERA DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.*

**❗ CONSERVATION : NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.**

**➔ DATE DE REVISION DE LA NOTICE :** Mars 1997.



Place Lucien Auvert - 77020 MELUN CEDEX