

crystal[®] adultes

Suppositoires
Glycérol

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Principe actif :

Glycérol 2,16 g

Excipients : Gélatine, eau purifiée
pour un suppositoire de 3,6 g

FORME PHARMACEUTIQUE ET CONTENU

Suppositoire. Boîte de 10 suppositoires.

CLASSE PHARMACOTHÉRAPEUTIQUE

LAXATIF. (A : Appareil digestif et Métabolisme)

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ? (INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES)

Ce médicament est un suppositoire. Il est préconisé dans certaines constipations et comme préparation à certains examens (rectoscopie : examen du rectum).

ATTENTION !

MISES EN GARDE SPÉCIALES

PAS D'UTILISATION PROLONGÉE SANS AVIS MÉDICAL.

Constipation occasionnelle :

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexpliquée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée) :

Elle peut être liée à deux causes :

- soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin,
- soit à un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autres :

- une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits...),
- une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits,
- une augmentation des activités physiques (sport, marche...),
- une rééducation du réflexe de défécation,
- parfois, l'adjonction de son à l'alimentation.

Il est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il est préférable d'éviter l'utilisation de ce médicament en cas de poussées hémorroïdaires, de fissure anale ou de rectocolite hémorragique (maladie caractérisée par l'érosion de la muqueuse du rectum et du côlon avec saignements et parfois suppuration).
EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS RÉCEMMENT UN AUTRE MÉDICAMENT, Y COMPRIS UN MÉDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE, PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

POSOLOGIE

Adultes : 1 suppositoire 5 à 30 minutes avant l'heure choisie pour aller à la selle à renouveler dans la demi-heure ou l'heure qui suit en cas de constipation rebelle.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie rectale. Le suppositoire peut être trempé dans l'eau froide pour en faciliter l'introduction.

DURÉE DU TRAITEMENT

Pas d'utilisation prolongée sans avis médical.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS (EFFETS INDÉSIRABLES)

COMME TOUT MÉDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

- sensation de brûlures anales,
- exceptionnellement, rectites congestives (inflammation du rectum).

SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.


NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ce médicament doit être conservé à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : Novembre 1995.

TITULAIRE/EXPLOITANT

 COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE
Place Lucien Auvert - 77020 MELUN Cedex

FABRICANT

LABORATOIRES GALÉNIQUES VERNIN
20, rue Louis-Charles Vernin - 77190 DAMMARIÉ-LES-LYS

7089090