

Mandarine

PÂTE PECTORALE À LA MANDARINE - PÂTE À SUCER

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

Dans cette notice :

- 1- Qu'est-ce que **PÂTE PECTORALE à la MANDARINE, pâte à sucer** et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **PÂTE PECTORALE à la MANDARINE, pâte à sucer** ?
- 3- Comment prendre **PÂTE PECTORALE à la MANDARINE, pâte à sucer** ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver **PÂTE PECTORALE à la MANDARINE, pâte à sucer** ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE PÂTE PECTORALE à la MANDARINE, pâte à sucer ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé comme adjuvant dans le traitement de la toux.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PÂTE PECTORALE à la MANDARINE, pâte à sucer ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais PÂTE PECTORALE à la MANDARINE :

Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'une des substances actives ou à l'un des composants contenus dans ce médicament.

Faites attention avec PÂTE PECTORALE à la MANDARINE :

- Ce médicament contient du saccharose, du sucre inverti et du sirop de glucose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase-isomaltase (maladies héréditaires rares).
- Une pâte à sucer contient 0,184 g de sirop de glucose, 0,138 g de sucre inverti et 0,667 g de saccharose dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.
- Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E110) et peut provoquer des réactions allergiques

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :

Demandez conseil à votre médecin ou

à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de PÂTE PECTORALE à la MANDARINE

Ce médicament contient du saccharose, du sirop de glucose, du sucre inverti et le colorant jaune orangé S (E110).

3- COMMENT PRENDRE PÂTE PECTORALE à la MANDARINE, pâte à sucer ?

Posologie et mode d'administration

Sucer 10 à 20 pâtes par jour.

Voie buccale.

Si vous avez pris plus de PÂTE PECTORALE à la MANDARINE que vous n'auriez dû

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre PÂTE PECTORALE à la MANDARINE

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, **PÂTE PECTORALE à la MANDARINE** est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance
Site internet : www.ansm.sante.fr

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5- COMMENT CONSERVER PÂTE PECTORALE à la MANDARINE, pâte à sucer ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption figurant sur la boîte

6- INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient **PÂTE PECTORALE à la MANDARINE** ?

Les substances actives sont : Aconitum TM (0,025 g), Bryonia TM (0,025 g), Drosera TM (0,025 g) et Radix (ipeca) TM (0,025 g) pour 100 g.

Les autres composants sont : gomme arabique, saccharose, sirop de glucose, sucre inverti, essence de mandarine. Colorant : jaune orangé S (E110).

Qu'est-ce que PÂTE PECTORALE à la MANDARINE et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de pâtes à sucer.

Boîte de 60 g environ.

Titulaire et exploitant :

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy - France

Fabricant :

BOIRON

La Tonnarderie - 41400 Montrichard - France

