

MYCOAPAISYL 1 POUR CENT,

Poudre pour application cutanée

Nitrate d'éconazole

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que MYCOAPAISYL 1%, poudre pour application cutanée et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser MYCOAPAISYL 1%, poudre pour application cutanée ?
3. Comment utiliser MYCOAPAISYL 1%, poudre pour application cutanée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MYCOAPAISYL 1%, poudre pour application cutanée ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE MYCOAPAISYL 1%, poudre pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est une poudre pour application locale contenant un antifongique de la famille des imidazolés.

Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines affections cutanées dues à des champignons (mycoses).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MYCOAPAISYL 1%, poudre pour application cutanée ?

N'utilisez jamais MYCOAPAISYL 1%, poudre pour application cutanée dans les cas suivants :

- hypersensibilité à l'un des composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec MYCOAPAISYL 1%, poudre pour application cutanée

Précautions d'emploi

- Evitez les applications près des yeux
- En cas d'application chez l'enfant, sur une grande surface, ou sur une peau lésée, respectez impérativement les recommandations et la posologie indiquée par votre médecin en raison de la pénétration plus importante du produit dans ces circonstances.

Evitez les applications dans les situations où le phénomène d'occlusion locale peut se reproduire (par exemple sujets âgés, escarres, intertrigo sous mammaire).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTÉE DES ENFANTS.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance, notamment si vous prenez des anticoagulants oraux.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT UTILISER MYCOAPAI SYL 1%, poudre pour application cutanée ?

Posologie / Mode d'administration / Fréquence d'administration

Médicament à usage local :

- Poudrer les régions atteintes et leur périphérie 2 fois par jour, après toilette et séchage de la peau.

Durée du traitement

La durée du traitement est de 2 à 4 semaines selon la mycose, elle peut être plus longue pour certaines localisations. L'utilisation régulière du produit pendant toute la durée du traitement est déterminante pour la réussite du traitement.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, MYCOAPAI SYL 1%, poudre pour application cutanée est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- démangeaisons, irritation, sensation de brûlure, rougeurs : il faut en avvertir votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER MYCOAPAI SYL 1%, poudre pour application cutanée ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser MYCOAPAI SYL 1%, poudre pour application cutanée après la date de péremption mentionnée sur l'emballage. Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient MYCOAPAI SYL 1%, poudre pour application cutanée ?

• **La substance active est :**

Nitrate d'éconazole..... 1 g
Pour 100 g.

• **Les autres composants sont :**

Talc, silice colloïdale anhydre (AEROSIL 300), oxyde de zinc léger.

Qu'est-ce que MYCOAPAI SYL 1%, poudre pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de poudre pour application cutanée. Boîte de 1 flacon.

Titulaire

MERCK MÉDICATION FAMILIALE SAS – 37, rue Saint-Romain – 69379 Lyon Cedex 08

Exploitant

MERCK MÉDICATION FAMILIALE – 18 C, boulevard Winston Churchill – 21000 DIJON

Fabricant

FAMAR LYON – 29, Avenue Charles de Gaulle - 69230 SAINT GENIS LAVAL

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 6 juin 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France) www.afssaps.fr



En France métropolitaine, Merck Médication Familiale participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Merck Médication Familiale vous demande, en conséquence, de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.

