

AMBROXOL MYLAN

0,6 %

chlorhydrate d'ambroxol

TROUBLES DE LA SÉCRÉTION BRONCHIQUE

SOLUTION BUVABLE
FLACON DE 150 ml
voie orale

Mylan
SANTÉ FAMILIALE



sur avis
médical

ARÔME
BANANE



ADULTES

SANS SUCRE SANS SUCRE SANS SUCRE SANS SUCRE SANS SUCRE SANS SUCRE SANS SUCRE
UCRE SANS SUCRE SANS SUCRE SANS SUCRE SANS SUCRE SANS SUCRE SANS SUCRE SANS

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Ce médicament est disponible sans ordonnance et vous permet donc de soigner des maladies bénignes sans l'aide d'un médecin. Néanmoins, vous devez utiliser Ambroxol Mylan 0,6 %, solution buvable avec précaution afin d'en obtenir le meilleur résultat.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après quelques jours, consultez un médecin.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Ambroxol Mylan 0,6 %, solution buvable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Ambroxol Mylan 0,6 %, solution buvable ?
3. Comment prendre Ambroxol Mylan 0,6 %, solution buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Ambroxol Mylan 0,6 %, solution buvable ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE AMBROXOL MYLAN 0,6 %, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un expectorant. Il facilite l'évacuation par la toux des sécrétions bronchiques.

Il est indiqué dans le traitement des troubles de la sécrétion bronchique de l'adulte, notamment au cours des affections bronchiques aiguës et des épisodes aigus de bronchopneumopathies chroniques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AMBROXOL MYLAN 0,6 %, solution buvable ?



Ne prenez jamais Ambroxol Mylan 0,6 %, solution buvable en cas d'allergie connue à l'un des composants de ce médicament.



Faites attention avec Ambroxol Mylan 0,6 %, solution buvable

En raison de la présence de sorbitol, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose (maladie métabolique héréditaire).

Il est conseillé de ne pas prendre de médicament antitussif ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par ce médicament.

Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées.



Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.



Grossesse - Allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et au cours de l'allaitement.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire

Sorbitol, glycérol.

3. COMMENT PRENDRE AMBROXOL MYLAN 0,6 %, solution buvable ?



Réservé à l'adulte.

Posologie

La posologie de ce médicament est de 5 à 10 ml de solution buvable, matin et soir, soit 1 dose de 5 ml à 1 dose de 10 ml du godet-doseur, matin et soir.

M.083086-B-v2

Si vous avez l'impression que l'effet d'Ambroxol Mylan 0,6 %, solution buvable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.



Mode d'administration

Voie orale.

Utiliser le godet-doseur fourni pour mesurer la quantité de produit à prendre par prise.

Pour bien mesurer la quantité de produit avec le godet-doseur :

- positionner le godet-doseur à l'horizontale,
- se placer en face du godet-doseur et à hauteur des yeux lors du remplissage.

Rincer à l'eau après chaque utilisation.

Ne pas réutiliser le godet-doseur pour administrer un autre médicament.

Fréquence d'administration

Les prises seront espacées à intervalles réguliers.

Durée de traitement

La durée de traitement ne dépassera pas 8 à 10 jours sans avis médical.

Si vous avez pris plus d'Ambroxol Mylan 0,6 %, solution buvable que vous n'auriez dû : consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre Ambroxol Mylan 0,6 %, solution buvable : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, Ambroxol Mylan 0,6 %, solution buvable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Possibilité de survenue de troubles digestifs mineurs à type de nausées, vomissements, brûlures d'estomac.
- Il est conseillé dans ces cas de diminuer la posologie.
- De plus, en raison de la présence de glycérol et de sorbitol, risque de troubles digestifs et de diarrhée.
- Ont été décrits :
 - des cas de réactions allergiques cutanées à type de rougeur, démangeaison, urticaire,
 - des cas de réactions de type allergique avec parfois œdème de Quincke (*gonflement du visage et gêne respiratoire*).

Dans ce cas, le traitement devra être impérativement interrompu.

- Rarement ont été rapportés des maux de tête ou des vertiges.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER AMBROXOL MYLAN 0,6 %, solution buvable ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Ambroxol Mylan 0,6 %, solution buvable après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient Ambroxol Mylan 0,6 %, solution buvable ?

La substance active est : Pour 100 ml de solution buvable
Chlorhydrate d'ambroxol..... 0,6 g

Les autres composants sont : glycérol, acide citrique monohydraté, parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, arôme banane, sorbitol liquide (non cristallisable), eau purifiée.

Qu'est-ce que Ambroxol Mylan 0,6 %, solution buvable et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable. Flacon de 150 ml avec un godet-doseur.

Titulaire - Exploitant :

MYLAN S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Fabricant :

NextPharma S.A.S.

17 Route de Meulan

78520 LIMAY - FRANCE

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : 12/2007